Como preparar um painel?

Felipe W. Amorim
Programa de Pós Graduação em Biologia Vegetal
Unicamp

Painel é um instrumento visual de comunicação científica.

Painel pode servir como:

- ❖ uma apresentação resumida do trabalho;
- ❖ forma de propaganda e divulgação de seu trabalho;
- ❖ uma fonte de informação científica;
- ❖ um ponto inicial para discussão de seu trabalho com colegas de várias partes do Brasil e do Mundo!

Para ser visto é preciso destacar-se!

Mas como é possível destacar-se??

Um bom painel deve ser:

- ❖ claro;
- ❖ bem organizado;
- ❖ sucinto;
- ❖ bem ilustrado com figuras e esquemas;
- ❖ formatado com o mínimo de texto, mas como máximo de informação possível!

Como estruturar um Painel??

Programas sugeridos para montar o painel:

Estruturando o Painel

Dimensões:

The image shows a screenshot of the Microsoft PowerPoint 2010 interface. The title bar reads "Apresentação2 - Microsoft PowerPoint uso não comercial". The ribbon includes "Arquivo", "Página Inicial", "Inserir", "Design", "Transições", "Animações", "Apresentação de Slides", "Revisão", "Exibição", "Suplementos", and "Acrobat". The "Design" ribbon is active, showing various themes and a "Temas" section. A "Configurar página" dialog box is open, displaying the following settings:

- Slides dimensionados para: Personalizar
- Largura: 100 cm
- Altura: 100 cm
- Numerar os slides a partir de: 1
- Orientação: Slides (Retrato selected, Paisagem unselected)
- Anotações, folhetos e tópicos (Retrato selected, Paisagem unselected)

Below the dialog box, a diagram of a slide is shown with a vertical double-headed arrow on the left labeled "100 cm" and a horizontal double-headed arrow at the bottom labeled "100 cm", indicating the slide dimensions.

At the bottom of the screen, the status bar shows "Slide 1 de 1", "Tema do Office", and "Português (Brasil)".

Estruturando o Painel

Estruturando o Painel

Tamanho e tipo de fonte, cores do plano de fundo e contraste com o texto:

O diagrama mostra um painel com uma estrutura de três barras decorativas no topo e um texto principal abaixo. A primeira barra é preta com o título 'Titulo do Painel' em cor-de-rosa. A segunda barra é ciano com o nome do autor 'Autor: Felipe W. Amorim' em verde. A terceira barra é verde com a filiação 'Filiação: Programa de Pós Graduação em Biologia Vegetal - Unicamp' em amarelo. O texto principal, em preto, explica a importância do tamanho da fonte para a legibilidade.

Titulo do Painel

Autor: Felipe W. Amorim

Filiação: Programa de Pós Graduação em Biologia Vegetal - Unicamp

O tamanho da fonte da fonte deve ser legível a pelo menos 1,5 de distância!

Portanto, prefira utilizar pouco texto com letras grandes com tamanho da fonte acima de 35.

Estruturando o Painel

Tamanho e tipo de fonte, cores do plano de fundo e contraste com o texto:

Cuidado com o conjunto de cores utilizado!

Logo da instituição

O que deve conter no painel?

Título

Autores

Filiação

Ilustrações

Esquemas

Órgãos de fomento

THE EVOLUTION OF KNOWLEDGE IN NECTARIVOROUS BIRD COMMUNITIES: OLD PATTERNS, NEW QUESTIONS AND PERSPECTIVES OF PROGRESS

Jeferson VIZENTIN-BUGONI & Pietro Kiyoshi MARUYAMA
 Pós-Graduação em Ecologia, UNICAMP, Campinas, SP, Brazil

UNICAMP

AIMS

- Review the ecological and evolutionary processes that affect the communities of three main families of nectarivorous birds: Trochilidae, Nectariniidae and Meliphagidae
- Describe the evolution of knowledge in these systems over three periods from 1950 to 2011
- Identify promising new approaches

METHODS

- Systematic searches for papers in online databases (*Web of Science*, *Scopus* and *Google Scholar*)
- Criteria of inclusion: higher number of citation, innovation on the theoretical or methodological approach and time of publication.
- We selected four papers for each of the three periods considered (1950-1979, 1980-1995 and 1996-present) for each of the nectarivorous birds group.
- Paper with low number of citations were included given that it has been published in the last five years or contained significant innovation.

RESULTS

Figure 2: The evolution of ecological knowledge in the communities of nectarivorous birds

CONCLUSIONS

The similarities among families had evolved by adaptive convergence for nectar feeding.

- Geographic barriers limit the dispersal of species at large (continents) and medium scale (e.g. two sides of Andes).
- At small scale (local communities) these communities are mainly structured by competition and mutualistic interactions with plants.
- Spatial (habitat, altitude) and behavioral segregation (gradient from exploitation to direct interference) and segregation by resources (floral morphology and gradients of nectar abundance) are recurring patterns.
- The initial framework of knowledge in these systems was established early, around 1980 decade.
- These patterns have been reinforced and complemented with new analytical approaches, such as null model analysis and the incorporation of other ecological processes.
- The inclusion of innovative approaches such as phylogenetic structure of communities and facilitation processes will improve the knowledge of these systems in the coming years.

*Authors were supported by CNPq.

Polinização por esfingídeos (Lepidoptera, Sphingidae) em área de Floresta Montana na Mata Atlântica no sudeste brasileiro

Felipe W. Amorim¹ (amorimfelipe@yahoo.com.br) & Marlies Sazima²
 1 – Programa de Pós Graduação em Biologia Vegetal/IB/Unicamp, 2 – Departamento de Biologia Vegetal/IB/Unicamp

UNICAMP

A polinização por mariposas (Lepidoptera, Heterocera) provavelmente é um dos sistemas mais comuns e menos estudados nos trópicos. Os esfingídeos (Lepidoptera, Sphingidae) estão entre os principais polinizadores em comunidades tropicais. Seu hábito alimentar aliado a morfologia do aparelho bucal e ao comportamento de visita nas flores, possibilita o contato com as partes reprodutivas das plantas, viabilizando a polinização e reprodução de espécies esfingófilas.

Este estudo teve como objetivos levantar a flora esfingófila e a fauna de esfingídeos em uma área de Floresta Ombrófila Densa Montana, no Núcleo Santa Virgínia, Parque Estadual da Serra do Mar, no sudeste do Brasil.

Morfologia e atributos florais da flora esfingófila.

Família / Espécie	Hábito	Comprimento da flor (mm)	Morfologia	Sistema sexual	Antese	Longevidade	Cor
APOCYNACEAE							
<i>Tabernaemontana</i> sp1	Arbóreo	15,54±1,07	Tubular	Hermafrodita	Crepus./Not.	2 dias	Crema/Verde
CAPRIFOLIACEAE							
<i>Lonicera japonica</i>	Liana	34,20±1,63	Tubular	Hermafrodita	Crepuscular	~ 3 dias	Crema
CHRYSOBALANACEAE							
<i>Couepia</i> sp	Arbóreo	32,79±2,14*	Pincel	Hermafrodita	Diurna/Crep.	1 noite	Hranco
FABACEAE							
<i>Inga seszilis</i>	Arbóreo	85,07±3,76*	Pincel	Hermafrodita	Diurna	1 dia	Hranco
<i>Inga marginata</i>	Arbóreo	11,31±1,23*	Pincel	Hermafrodita	Diurna	1 dia	Hranco
<i>Inga barbata</i>	Arbóreo	30,65±2,47*	Pincel	Hermafrodita	Diurna	1 dia	Hranco
MALVACEAE							
<i>Pseudobombax grandiflorum</i>	Arbóreo	123,66±5,42*	Pincel	Hermafrodita	Noturna	Não determ.	Hranco
ORQUIDACEAE							
<i>Habenaria paulistana</i>	Herbáceo	134,36±6,78	Colorada	Hermafrodita	Noturna	~ 7 dias	Hranco+varad.
RUBIACEAE							
<i>Amatoua guianensis</i>	Arbóreo	11,53±0,43	Tubular	Ditica	Diurna/Crep.	1 dia	Crema
<i>Hillia parasitica</i>	Herb./Epífita	80,56±15,16	Tubular	Hermafrodita	Diurna/Crep.	3 a 4 dias	Hranco/Rosa
<i>Posoqueria latifolia</i> cf.	Arbóreo	128,88±7,83	Tubular	Hermafrodita	Noturna (?)	determinada	Hranco
<i>Rubiaceae</i> sp1	Arbóreo	20,97±1,30	Tubular	Heterostilica (?)	Noturna	1 dia (?)	Crema
SOLANACEAE							
<i>Cestrum</i> sp1	Arbustivo	17,97±0,00	Tubular	Hermafrodita	Noturna	~ 3 dias	Verde
<i>Cestrum</i> sp2	Arbustivo	17,78±0,06	Tubular	Hermafrodita	Noturna	~ 3 dias	Verde
ZINGIBRACEAE							
<i>Medichium coronatum</i>	Herbáceo	73,76±22,98	Tubular	Hermafrodita	Diurna/Crep.	2 dias	Hranco

Morfologia de algumas espécies esfingófilas. A - C. Flores predominantemente estaminadas com morfologia do tipo pincel. A. *Inga sessilis*; B. *Inga barbata*; C. *Pseudobombax grandiflorum*; D - G. Flores com morfologia tubular, que variaram de tubos curtos como em D. *Tabernaemontana* sp. e E. *Cestrum* sp.2; a tubos excepcionalmente longos que restringem o acesso ao néctar apenas para visitantes com aparelhos bucais longos, como em F. *Hillia parasitica*; G. *Posoqueria latifolia* cf. e H. *Habenaria paulistana*.

Visitas de esfingídeos em *Inga sessilis*. A. *Manduca rustica*; B. *Erinnyis ello*; C. *Manduca hamnibal*. Note no canto superior de cada imagem as respectivas mariposas capturadas em armadilha luminosa na área de estudos.

Fenologia da flora esfingófila. Coloração cinza escuro indica períodos de pico de floração e cinza claro indica períodos de floração moderada.

Família / Espécie	Período de floração												Tipo de Floração
	Jan	Fev	Mar	Abr	Mai	Jun	Jul	Ago	Sep	Out	Nov	Dez	
APOCYNACEAE													Anual
<i>Tabernaemontana</i> sp1													
CAPRIFOLIACEAE													Subanual
<i>Lonicera japonica</i>													
CHRYSOBALANACEAE													Anual
<i>Couepia</i> sp													
FABACEAE													Contínuo
<i>Inga seszilis</i>													
<i>Inga marginata</i>													
MALVACEAE													Anual
<i>Pseudobombax grandiflorum</i>													
ORQUIDACEAE													Anual
<i>Habenaria paulistana</i>													
RUBIACEAE													Contínuo
<i>Amatoua guianensis</i>													
<i>Hillia parasitica</i>													
<i>Posoqueria latifolia</i> cf.													
SOLANACEAE													Contínuo
<i>Cestrum</i> sp1													
<i>Cestrum</i> sp2													
ZINGIBRACEAE													Subanual
<i>Medichium coronatum</i>

Exemplos de algumas espécies de esfingídeos presentes no Núcleo Santa Virgínia entre o período de março de 2008 e julho de 2009.

Os COMPRIMENTOS DOS TUBOS FLORAIS DAS ESPÉCIES ESFINGÓFILAS E DAS PROBÓCIDES DOS ESFINGÍDEOS, POSSUEM UMA DISTRIBUIÇÃO SEMELHANTE. NESTE SENTIDO, ASSIM COMO OBSERVADO PARA OUTRAS ÁREAS TROPICAIS, PROVAVELMENTE EXISTE UMA CORRESPONDÊNCIA MORFOLÓGICA AO NÍVEL DE COMUNIDADE ENTRE OS COMPRIMENTOS DAS PROBÓCIDES DOS ESFINGÍDEOS E DOS TUBOS FLORAIS DAS PLANTAS ESFINGÓFILAS DA REGIÃO.

APOIO:

ECOLOGIA DA POLINIZAÇÃO E REPRODUÇÃO DE *Amaioua guianensis* AUBL. (RUBIACEAE)

Felipe Wanderley Amorim^{1,2} e Paulo Eugênio Oliveira¹

(1) Instituto de Biologia - Universidade Federal de Uberlândia (2) Autor para correspondência: felipeufu@yahoo.com.br

➤ A ecologia reprodutiva de *Amaioua guianensis* foi estudada numa área de Mata Mesófila Semidecídua no Parque do Sabiá, Uberlândia-MG, Brasil. Foram investigadas a fenologia, a morfologia floral, o conjunto de polinizadores e dispersores, o sistema reprodutivo, e a estrutura sexual dos indivíduos reprodutivos.

➤ Fenologia

❖ O padrão fenológico encontrado (fig. 1) foi similar a floração do tipo Cornucópia (*sensu* Gentry 1974*), associado à atração de um grande espectro de visitantes florais e potenciais polinizadores.

➤ Biologia Floral

❖ As flores são unissexuadas, 6-meras, tubulares, esbranquiçadas e odoríferas (fig. 2, flor pistilada; fig. 3, flor estaminada).

❖ Polinização por abelhas grandes (*Epicharis flava*, fig. 4) e esfingídeos (*Aellopos titan*, fig. 5).

❖ Flores dispostas em inflorescências terminais, umbelas compostas nos machos (fig. 6A) e simples nas fêmeas (fig. 6B).

❖ Estruturas sexuais não funcionais do morfo oposto (figs. 6 C e D), contudo o estilete nas flores estaminadas funciona como pseudo-estame (fig. 6C), tipo de apresentação secundária de pólen comum na tribo Gardenieae, mas ainda não descrito para a espécie.

❖ Estruturas florais variaram entre os morfos sexuais (Tabela 1). As flores estaminadas são mais conspicuas e em maior número que as pistiladas.

Parâmetros Morfológicos e Morfométricos analisados	N	Média ± Desvio Padrão		U
		Flores Estaminadas	Flores Pistiladas	
Flores/Inflorescência	61	18,8 ± 6,66 a	6,90 ± 2,85 b	72,5
Comprimento do Cálice (cm)	53	0,49 ± 0,03 a	0,377 ± 0,03 b	1,5
Comprimento da Corola (cm)	53	1,14 ± 0,05 a	0,798 ± 0,08 b	0,00001
Comprimento das Anteras (cm)	53	0,55 ± 0,03 a	0,35 ± 0,23 b	53
Comprimento do Estilete (cm)	53	1,06 ± 0,05 a	0,82 ± 0,11 b	6,5
Número de Pétalas	53	6,02 ± 0,14 b	6,64 ± 0,74 a	712,5

a, b indicam pares com p < 0,001 pelo teste Mann-Whitney (U).

➤ Estrutura Sexual

❖ A espécie apresentou uma razão sexual de 1,49, com diferenças significativas a favor do sexo masculino (67:45; $\chi^2 = 4,32$; p < 0,05). A sequência de amostragem dos morfos sexuais "Run test" (fig. 7), indicou segregação espacial de sexo, ou seja, a população possui agrupamento entre os morfos sexuais.

Razão sexual 1,49 (67 Machos "E" : 45 Fêmeas "P"; N = 112)

EEEE PP E PP EEEEE PPP E P EEE P EEEEE PP E P EEE PPPP EEE
PPPP EE P EE PP EEEEE P EEEEEEE P E PPP EEEEEEEE PPPP E PPPPP
EE PPP EE PP EEE PPP E

Runs (sequência de letras sublinhadas) = 39; t = 3,03; p < 0,05.

❖ Em teoria a razão sexual em plantas dióicas deveria ser de 1:1, porém desvios nesta razão são frequentemente encontrados em espécies dióicas tropicais e vários fatores podem ocasionar o desvio desta proporção.

➤ Hipóteses para o desvio da Razão Sexual

❑ Maturação e/ou Mortalidade diferencial entre Machos e Fêmeas

❖ Apesar de uma maior frequência de machos nas maiores e principalmente nas menores classes de área basal (fig. 8), o teste Kolmogorov-Smirnov "D", não mostrou diferenças significativas. Portanto, este fator não pode ser apontado como causa do desvio da razão sexual em *A. guianensis*.

❑ Seleção Gamética

❖ Seleção gamética tão pouco parece ser a causa do desvio da razão sexual em *A. guianensis*. A grande proporção de flores estaminadas em relação às pistiladas (tabela 1), e a eficácia do sistema de polinização (análises sob microscopia de fluorescência - fig. 9 - mostraram que 98,6% das flores são efetivamente polinizadas), é possível verificar que o número de grãos de pólen a alcançar estigmas coespecíficos não é o fator limitante para produção de sementes. Esta seria a principal causa de desvio da razão sexual a favor de machos por seleção gamética.

❑ Reprodução Vegetativa

❖ Reprodução vegetativa observada comumente na área de estudo, provavelmente atua como fator causal do desvio da razão sexual em *A. guianensis*, talvez pelos machos possuírem menores limitações que fêmeas, em termos energéticos, para produzirem novos indivíduos vegetativamente (fig. 10). Neste contexto, além de interferir na razão sexual, a reprodução vegetativa, também influencia no padrão espacial de distribuição dos morfos sexuais na área.

* GENTRY, H.A. 1974. Flowering Phenology and diversity in Tropical Bignoniaceae. *Biotropica* 6(1):64-68.

DISTRIBUIÇÃO, RIQUEZA E ABUNDÂNCIA DE ESFINGÍDEOS (LEPIDOPTERA, SPHINGIDAE) NO BIOMA CERRADO, UBERLÂNDIA-MINAS GERAIS, BRASIL

Amorim, Felipe Wanderley^{1,3}; Ávila Jr., Rubem Samuel^{1,2,4}; Oliveira, Paulo Eugênio^{1,5}.

(1) Instituto de Biologia - Universidade Federal de Uberlândia (2) UNICAMP (3) Acadêmico (4) Doutorando (5) Docente. felipeufu@yahoo.com.br

A proteção dos biomas tropicais e de suas espécies frente à iminente extinção é uma questão prioritária. O manejo da biodiversidade constitui um desafio complexo que requer conhecimentos básicos sobre taxonomia, estrutura populacional e genética, assim como, as interações e a biologia reprodutiva dos organismos ali presentes. Este trabalho teve como objetivo, conhecer e analisar a fauna de esfingídeos presente numa área de Cerrado sensu lato em Uberlândia - Minas Gerais/ Brasil, relacionando-a com os recursos florais e condições ambientais da região.

TABELA 1 - Padrão sazonal de distribuição de espécies; índices de Diversidade, Uniformidade e Similaridade da fauna de esfingídeos na Estação Ecológica do Panga, Uberlândia - MG. Faixa Amarelo representa período seco e em Azul período chuvoso.

ESPÉCIES	2001			2002			2003			2004			Prevalência (%)
	AGO	SET	OUT	NOV	DEZ	JAN	FEB	MAR	ABR	MAI	JUN	JUL	
MACROGLOSSINAE - Hübner, 1819													
<i>Dolichopodini</i> - Burmeister, 1879													
<i>Aellops titan</i> (Cramer, 1777)													0,2200,0
<i>Aletris chloropoda</i> (Perry, 1838)													1,0
<i>Callionima proteus</i> (Rottschid, 1894)													1,0
<i>Callionima nevai</i> (Orbigny & Péron, 1840)													0,97
<i>Callionima parca</i> (Fabricius, 1775)													0,9930,044
<i>Enyo nigres</i> (Linnaeus, 1758)													0,8000,104
<i>Enyopsis alpe</i> (Drury, 1774)													4,3100,178
<i>Enyopsis eto</i> (Linnaeus, 1758)													0,8970,324
<i>Enyopsis obscura</i> (Fabricius, 1775)													0,1000,012
<i>Enyopsis senecio</i> (Cramer, 1774)													0,9900,407
<i>Enyopsis sp</i> (Hübner, 1819)													4,16
<i>Euglyphesoma sagax</i> (Perry, 1838)													1,0
<i>Euglyphesoma carmine</i> (Linnaeus, 1758)													0,4400,020
<i>Euglyphesoma menachae</i> (Boidard, 1875)													0,4400,042
<i>Isandryx phlo</i> (Cramer, 1778)													4,0
<i>Myiocyrtus cognatus</i> (Waller, 1856)													1,0
<i>Periploca fovea</i> (Linnaeus, 1758)													0,4700,106
<i>Periploca agnes</i> (Gahan, 1944)													4,1
<i>Periploca huxia</i> (Fabricius, 1777)													1,0
<i>Pseudosphinx eras</i> (Linnaeus, 1771)													0,7100,341
MEGALOPTERINAE - Guenée, 1852													
<i>Chimaphysa eras</i> (Linnaeus, 1771)													4,4
<i>Elysipterus amicus amicus</i> (Cramer, 1777)													1,0
<i>Elysipterus pistis</i> (Boidard, 1875)													0,1000,340
<i>Elysipterus eras</i> (Linnaeus, 1771)													0,1000,340
PHALGIDINAE - Guenée, 1852													
<i>Phalga adamsi</i> (Rottschid & Gofredo, 1900)													0,7900,307
<i>Phalga anchemolus</i> (Cramer, 1779)													0,8100,310
<i>Phalga fasciata</i> (Waller, 1856)													4,4
<i>Phalga labrusca</i> (Linnaeus, 1758)													0,8700,061
EMERITINAE - Strenck & Robinson, 1866													
<i>Amaliopteryx</i> - Burck, 1876													
<i>Protambulix euryleta</i> (Hübner-Godwin, 1834)													0,4000,010
<i>Protambulix strigilis</i> (Linnaeus, 1771)													0,9000,314
SPHINGINAE - Latreille, 1802													
<i>Acrotus</i> - Burck, 1876													
<i>Agrotis cingulata</i> (Fabricius, 1774)													0,0200,119
<i>Chimaphysa</i> - Latreille, 1802													
<i>Chimaphysa antea</i> (Drury, 1774)													0,1000,116
<i>Chimaphysa lucifer lucifer</i> (Rottschid & Gofredo, 1900)													0,4200,150
<i>Manduca albigera</i> (Waller, 1856)													0,0
<i>Manduca difflua</i> (Burr, 1871)													0,0010,100
<i>Manduca foresta</i> (Roth, 1743)													0,0
<i>Manduca hammondi</i> (Cramer, 1779)													0,04
<i>Manduca huachuca</i> (Cramer, 1790)													0,0000,100
<i>Manduca mundivoides</i> (Rottschid, 1896)													0,41
<i>Manduca rustica</i> (Fabricius, 1779)													11,2100,91
<i>Manduca sexta</i> (Linnaeus, 1758)													10,61700,90
<i>Megastictus dimorpha</i> (Cramer, 1778)													0,0

O presente estudo demonstra que a esfingofauna presente na Estação Ecológica do Panga, representa cerca de 16,2% de todas as espécies de esfingídeos encontradas na América do Sul e aproximadamente 4,0% das espécies encontradas em todo o Mundo. Considerando-se fatores como: o atual estado de conservação do bioma Cerrado; o tamanho da área de estudos; o esforço amostral empregado (uma coleta a cada mês); a riqueza e abundância local, verificamos que a região dos Cerrados de Uberlândia possui grande importância no quadro nacional de conservação do grupo, bem como, das espécies vegetais a ele associadas.

Agradecemos ao Sr. "José do Panga" pelo apoio logístico e ao Ms. Amábilio Camargo (EMBRAPA - Cerrados) pelo auxílio na identificação dos Esfingídeos.

FIGURA 1 - Padrão sazonal de floração de plantas arbóreas potencialmente esfingífilas (número de espécies), de riqueza de esfingídeos e de distribuição do comprimento (média) de probóscides na Estação Ecológica do Panga, Uberlândia - MG. Faixa em Vermelho representa o período de floração das espécies esfingífilas mais especializadas. A) *Tocoyena formosa* (Rubiaceae) B) *Qualea grandiflora* (Vochysiaceae). Faixa em Amarelo representa período chuvoso e em Azul período seco. Fotos: Paulo Oliveira.

FIGURAS - 2 Área de estudos (ponto de coleta circunscrito) - Estação Ecológica do Panga (Fonte: Schiavini & Araújo, 1989); **3** Armadilha luminosa utilizada na captura das mariposas (adaptado de Camargo, 1999); **Figuras 4 a 18**) Diversidade de Esfingídeos presente na EEP. **4)** *Manduca sexta*; **5)** *Protambulix strigilis*; **6)** *Erinnys ello* visitando flor de *Hymaenaea courbarii*; **7)** *Agrotis cingulata*; **8)** *Coegytus lucifer lucifer*; **9)** *Manduca rustica*, notar comprimento da probóscide; **10)** *Periploca fovea*; **11)** *Periploca agnes*; **12)** *Elysipterus amicus amicus*; **13)** *Eumorphia labrusca*; **14)** *Eumorphia fasciata*; **15)** *Aellops titan*; **16)** *Callionima parca*; **17)** *Xylophanes tersa*; **18)** *Enyo nigres*. Escala = 1,0cm. Fotos: 3 a 18 - Felipe Amorim; exceto foto 6 - Paulo Oliveira.

Biologia floral e sistema reprodutivo de *Faramea cyanea* Müel. Arg. (Rubiaceae), uma espécie distílica de áreas florestais do bioma Cerrado

Felipe Wanderley AMORIM^{1,4}; Pietro Kiyoshi MARUYAMA-MENDONÇA²; Tiago Luis Massochini FRIZZO³; Paulo Eugênio OLIVEIRA³

(1) Programa de Pós-Graduação em Ecologia e Conservação de Recursos Naturais - UFU (2) Graduação em Ciências Biológicas - UFU (3) Docente - UFU (4) Autor para contato: amorimfelipe@yahoo.com.br

> A distílica é um dimorfismo floral geneticamente controlado que compreende populações compostas por indivíduos produtores de flores com as anteras posicionadas acima do estilete (Brevistilas), ou flores em que o estilete localiza-se acima das anteras (Longistilas).

> Tabela 1. Comparações morfométricas entre flores longistilas e brevistilas em *Faramea cyanea*. Valores seguidos de letras distintas diferem significativamente pelo teste *t* de student para $P < 0,01$.

> Figuras 1 - 3. Aspectos morfológicos de *Faramea cyanea*. 1. Flor brevistila (notar posição anteras); 2. Flor longistila (notar posição estigma); 3. Flor longistila e brevistila em corte longitudinal apresentando a separação dos estigmas e anteras (hercogamia) em ambos os morfos.

Caracteres Morfométricos cm (n = 51)	Média ± Desvio Padrão		Valor de t (GL=98)
	Longistilos	Brevistilos	
Comprimento tubo corola	0,96 ± 0,1	A 1,16 ± 0,136	B 8,358
Largura mínima tubo corola	0,15 ± 0,014	A 0,13 ± 0,01	B 11,994
Largura máxima tubo corola	0,24 ± 0,017	A 0,24 ± 0,018	A 1,129
Comprimento filete	0,69 ± 0,086	A 1,03 ± 0,112	B 16,926
Comprimento estilete	0,97 ± 0,124	A 0,29 ± 0,064	B 34,643
Comprimento antera	0,39 ± 0,037	A 0,40 ± 0,023	A 1,074
Comprimento estigma	0,36 ± 0,05	A 0,39 ± 0,082	A 1,854
Altura antera	0,95 ± 0,125	A 1,29 ± 0,111	B 14,540
Altura estigma	1,34 ± 0,151	A 0,68 ± 0,109	B 25,006
Separação Estima / Antera	0,39 ± 0,085	A 0,62 ± 0,166	B 8,732

> Espera-se para tais populações, um equilíbrio entre os dois morfos florais denominado de isopletia, ou seja, uma razão entre plantas longistilas e brevistilas próxima de 1.

> Foram encontrados na população de *Faramea cyanea* estudada um total de 70 indivíduos reprodutivos, sendo 29 BREVISTILOS e 41 LONGISTILOS. A razão entre plantas longistilas e brevistilas foi de 1,41 com revés para o morfo longistilo. Esta diferença não foi significativa pelo teste Qui Quadrado ($\chi^2 = 2,06, P > 0,05$). Portanto, a espécie apresentou ISOPLEZIA populacional.

> Além das diferenças morfológicas este mecanismo também evolui sistemas genéticos de auto-incompatibilidade, prevenindo auto fecundações, assim como, fecundações entre indivíduos de mesmo morfo.

> Tabela 1. Sistema reprodutivo de *Faramea cyanea*.

Tipo de tratamento	N	Nº Frutos produzidos	% Frutos produzidos
Long x Long	30	3	10
Brev x Brev	30	0	0
Long x Brev	30	7	23,3
Brev x Long	30	3	10
Polinização natural flores longistilas	86	21	24,5
Polinização natural flores brevistilas	59	14	23,7

> Figuras 4. Altura das anteras e estigmas em flores brevistilas e longistilas de *Faramea cyanea*. (n = 51 flores de cada morfo).

> A figura acima mostra que há uma marcada separação nas alturas dos estigmas em flores brevistilas e longistilas não havendo nenhuma sobreposição entre os morfos. Já para as alturas das anteras, apesar de haver diferenças significativas entre os morfos florais (ver tabela 1), a figura acima mostra haver grande sobreposição entre ambas.

> Figura 5. Interrupção do crescimento dos tubos polínicos a nível de estigma em cruzamento ilegítimo em flor brevistila; 6 e 7. Crescimento normal dos tubos polínicos de cruzamentos legítimos em flor brevistila e longistila respectivamente; 8. Cruzamento ilegítimo em flor longistila, notar no detalhe abaixo reação de incompatibilidade a nível de estigma causando a interrupção do crescimento dos tubos polínicos.

Auto-ecological studies: pollination ecology and reproductive biology of flowering plants¹

Amorim, F.W.; Agostini, K.; Avila Jr., R.S.; Brito, V.L.G.; Canela, M.B.; Fonseca, L.; Galetto, L.; Nunes, C.E.P.; Fernández Otárola, M.; Pansarin, L.; Papiorek, S.; Pinheiro, M.T.; Wyatt, G. & Sazima, M.
 1 - This poster is part of the Biota Functional Gradient Thematic Project (FAPESP 03/12595-7)

The interactions between flowers and pollinators are important to the organization of plant communities in tropical ecosystems. Pollination ecology and breeding systems are directly related to the genetic structures and dynamics of plant populations. Understanding plant flowering patterns, pollination mechanisms and the interactions between plants and pollinators is crucial to adopt effective strategies for conservation and management of threatened ecosystems as the Brazilian Atlantic Rainforest.

Our main goals were to study the floral biology, flowering phenology, pollination ecology and genetics of a wide group of Angiosperm families in two sites in the Atlantic Rainforest in the Serra do Mar State Park, southeastern Brazil. These included: Amaryllidaceae, Acanthaceae, Apocynaceae, Begoniaceae, Bromeliaceae, Cactaceae, Capparidaceae, Campanulaceae, Chrisobalanaceae, Convolvulaceae, Fabaceae, Gesneriaceae, Malvaceae, Melastomataceae, Myristicaceae, Orchidaceae, Rubiaceae, Solanaceae and Verbenaceae. The studies were carried out in a lowland forest area at Núcleo Picinguaba and in a montane forest area at Núcleo Santa Virgínia.

Pollination of Legume species (Fabaceae)

The pollination of legume species is associated mainly with bees, but other animal groups such as birds, bats and hawkmoths act as important pollinators as well.

Pollination of Orchid species

Specialized pollination systems in orchids involving hummingbirds, euglossini bees, long-tongued hawkmoths and pollination by deceit.

Begonia species pollination (Begoniaceae)

This is the first comprehensive study of pollination ecology and reproduction of *Begonia* species pollinated by bees in the Atlantic Rainforest.

Reproductive ecology of *Virola* species (Myristicaceae)

Contrasting reproductive phenological strategies for sympatric Nutmeg tree species. *Virola bicuhyba* reproduction occurs annually with a synchronized flowering peak for both sexes. *Virola gardneri* presents a biennial reproduction for both sexes, but every year some individuals in the population reproduce. This species shows massive, highly synchronized flowering episodes.

Pollination and genetics of Melastomataceae

Flower morphology and bee visitation in *Tibouchina pulchra*. The plant genotypes of two populations, Núcleo Santa Virgínia (black lines) and Núcleo Picinguaba (gray lines) are shown by the neighbor joining tree.

Flower color analyses

The reflection properties of ultraviolet light differs between bee-pollinated flowers and hummingbird-pollinated flowers, providing them a "private niche"

Hummingbird pollination and nectar analyses

Hummingbird pollination is one of the most common and important systems in the Atlantic Rainforest.

Nectar dynamics, the effect of its removal by pollinators, and nectar chemical compounds were analyzed in almost 200 species.

Pollination network of sphingids and sphingophylous plants

The pollination network of hawkmoths and plants shows a highly nested structure. Such a pattern is generated by two groups of species with different ecological properties. A core group of generalist species interacts with each other, while a group of specialists interacts only with generalist species. The network is based on the pollen carried by the hawkmoths. Pollen analyses indicated that sphingid moths can travel from lowland to montane forest, acting as mobile links between these two environments.

CONCLUSIONS

This sub-project gathered the biggest database about floral biology, pollination ecology and reproductive systems of Atlantic Rainforest Angiosperms. The results allow a better understanding of the pollination mechanisms and reproductive strategies of flowering plants in this biodiversity hotspot with priority for conservation in the world. This data set makes possible a wide range of comparisons with other Brazilian Biomes as well as Neotropical ecosystems.

Apesar da importância da família Orchidaceae nas comunidades das florestas tropicais, os estudos sobre biologia reprodutiva de orquídeas, principalmente as polinizadas por beija-flores, são escassos.

Elleanthus brasiliensis ocorre na Mata Atlântica e suas flores apresentam características para polinização por beija-flores. Estudos sobre a biologia reprodutiva desta espécie são importantes para avaliar o seu papel na organização deste ecossistema.

O presente trabalho teve por objetivo estudar a biologia da polinização e reprodução de *E. brasiliensis*, visando à ampliação dos conhecimentos sobre as interações entre fauna e flora da Mata Atlântica e o fornecimento de subsídios para programas de manejo e conservação, aspecto relevante ante a degradação dos ambientes naturais.

A. Hábito de *E. brasiliensis*, mostrando ramo pendente com inflorescência.
B. Detalhe da inflorescência que contém diversas flores rosadas esbranquiçadas e cujo tubo é coberto por mucilagem (seta). Barras de escala: A = 30 cm, B = 2 cm.

Elleanthus brasiliensis apresenta crescimento durante o ano todo, com emissão e senescência de novos caules e folhas, não ocorrendo época determinada de pico de crescimento. A floração ocorre de janeiro a março, com um curto e intenso período de pico de floração, caracterizada como do tipo cornucópia. As flores são diurnas, rosadas e duram de dois a quatro dias, sendo que no primeiro dia o labelo possui formato de tubo estreito, com ca. de 7 mm de diâmetro e a partir do segundo dia apresenta ca. de 11 mm de diâmetro. Os estigmas estão receptivos desde a fase de botão até a senescência da flor. Ocorre uma fase de protândria mecânica quando somente a parte masculina está acessível e posteriormente ocorre a fase feminina, fenômeno que favorece a polinização cruzada.

A formação de frutos em polinizações cruzadas e em condições naturais é alta, mas não ocorre agamospermia ou autopolinização espontânea, portanto há dependência do polinizador para a formação de frutos. A espécie é autocompatível, uma vez que há formação de frutos em autopolinizações manuais.

Flores imersas em solução de Vermelho Neutro tiveram somente a superfície interna do labelo corada (Figura 1), indicando a existência de osmóforos, células secretoras de odor. A presença de odor é um atrativo em flores polinizadas por abelhas, no entanto é ineficaz na atração de beija-flores.

As flores apresentam volume médio de néctar de 4,72 μ l $\pm$ 3,31 μ l e concentração de açúcares média de 21 % $\pm$ 5,66. A presença de néctar nas flores mais velhas sugere que não ocorre reabsorção. Não foi detectada a presença de açúcares na mucilagem.

Os visitantes e seu comportamento constam da Tabela 1. Os beija-flores visitavam as flores em qualquer fase da antese, ao passo que as abelhas visitavam-nas principalmente a partir do segundo dia de antese em diante, isto é, quando o tubo do labelo é mais largo e as chances de remover polínias são baixas.

Tabela 1. Visitantes florais de *Elleanthus brasiliensis* e suas respectivas frequências de visitação, mobilidade entre as plantas e tipo de visita – legítima ou ilegítima.

Visitantes florais	Frequência de visitação (% de visitas)	Mobilidade entre diferentes indivíduos	Tipo de visita
<i>Trigona</i> sp. (Meliponini)	94,96	baixa	legítima
<i>Ramphodon naevius</i> (Phaethornithinae)	2,85	alta	legítima
<i>Amazilia versicolor</i> , <i>Thalurania glaucopis</i> e <i>Florisuga fusca</i> (Trochilinae)	1,32	alta	legítima
borboleta (Hesperiidae)	0,66	baixa	legítima
moscas-da-fruta (Tephritidae)	0,22	baixa	ilegítima

Atividades desenvolvidas:

- visitas mensais ao Parque Estadual da Serra do Mar – Núcleo Picinguaba, Ubatuba, SP – e acompanhamento de 21 indivíduos marcados para registrar a fenologia;
- observações de campo durante o período de floração para registrar dados sobre biologia floral e determinar os visitantes e os polinizadores;
- experimentos de polinização controlada *in situ* para caracterizar o sistema reprodutivo, constando de: autopolinização espontânea, autopolinização manual, emasculação (agamospermia), polinização cruzada e controle (condições naturais);
- coleta e caracterização (volume e concentração de açúcares) do néctar *in situ*;
- análise dos dados no laboratório de Biosistemática do Departamento de Botânica.

Polinizadores de *Elleanthus brasiliensis*. A. *Trigona* sp., estas abelhas foram os visitantes mais frequentes. B. *Ramphodon naevius*, o beija-flor mais frequente às flores. C. O beija-flor *Amazilia versicolor* em visita a uma inflorescência. D. Hesperídeas com polínias aderidas à cabeça (seta) em visita à inflorescência. Barras de escala: A = 1 cm, B = 10 cm, C = 10 cm, D = 2 cm.

Figura 1. Teste do vermelho neutro em flor de *Elleanthus brasiliensis*. À direita, labelo de flor controle e à esquerda, labelo de flor corada evidenciando a presença de osmóforos. Barra de escala = 1 cm.

Elleanthus brasiliensis apresenta diversas características ornitófilas e, entre os beija-flores, *Ramphodon naevius* é o principal polinizador. As abelhas, devido ao seu comportamento, são copolinizadoras. Pelo fato dos beija-flores visitarem diversos indivíduos em sequência, favorecem a polinização cruzada ao contrário das abelhas. Um atributo floral importante é o formato do labelo cujo diâmetro favorece a remoção das polínias pelos beija-flores em detrimento das abelhas. A mucilagem parece ser eficiente mecanismo contra pilhagem de néctar, uma vez que a ausência total de açúcares reforça a hipótese de proteção a botões e flores.

Verificação de indução de diapausa, dimorfismo sexual e protandria em *Chlosyne lacinia* (Lepidoptera; Nymphalidae)

Leonardo Ré-Jorge¹, André V. L. Freitas² & Louis B. Klaczko³

¹Graduação em Ciências Biológicas; ²Departamento de Zoologia; ³Departamento de Genética e Evolução Universidade Estadual de Campinas

Introdução

A variação nos padrões de coloração das asas das borboletas pode representar diferentes efeitos, incluindo plasticidade fenotípica, dependente de temperatura ou fotoperíodo ou polimorfismos. A borboleta *Chlosyne lacinia* apresenta grande variação nos padrões de asas, e pode ser utilizada como modelo no estudo de balanços entre tamanho e tempo de desenvolvimento, a partir do estudo do dimorfismo sexual.

Figura 1: Diferentes variantes morfológicas de *Chlosyne lacinia*

C. lacinia também apresenta facilidades no estudo por ovipositar grandes massas de ovos, e ser de fácil manejo no laboratório. A espécie ocorre em grande parte da América, possuindo diferentes dinâmicas populacionais nas regiões de sua distribuição. No norte realiza diapausa durante o inverno, enquanto na Costa Rica há adultos durante o ano todo. Na região sudeste do Brasil, adultos ocorrem durante parte do verão e outono. Esse padrão pode ser devido a diapausa ou grande redução na densidade populacional no inverno ou por imigração vinda de outras regiões no verão.

Objetivo

O trabalho teve como objetivo padronizar a criação de *C. lacinia* em laboratório e verificar a indução de diapausa por temperatura e fotoperíodo e ocorrência de dimorfismo sexual e protandria neste animal.

Material e Métodos

Foi coletada uma oviposição de *Chlosyne lacinia* na face abaxial da folha de *Tithonia diversifolia* localizadas no município de Campinas.

Figura 2: *C. lacinia* em diferentes estágios de desenvolvimento: ovo, lagarta e pupa

Após a eclosão os animais foram divididos em 4 tratamentos de temperatura e fotoperíodo:

- Tratamento 1: 24°C 12/12 (60 indivíduos);
- Tratamento 2: 20°C 12/12 (40 indivíduos);
- Tratamento 3: 20°C 10/14 (20 indivíduos) e
- Tratamento 4: 18°C 12/12 (60 indivíduos).

Os indivíduos foram criados em recipientes plásticos, divididos em grupos com cerca de 20 larvas e foram alimentados com folhas frescas de *Tithonia diversifolia*.

Após a emergência, os indivíduos tiveram seu sexo determinado e foi medido o comprimento das asas posteriores e anteriores de cada animal.

Resultados

No tratamento 1 emergiram 27 indivíduos. No tratamento 2, quatro indivíduos empuparam, sendo que nenhum emergiu; no tratamento 3, sete indivíduos empuparam e um emergiu e no tratamento 4, dois indivíduos empuparam e um deles emergiu. Entre os indivíduos que chegaram a adulto, foram observados 10 machos e 19 fêmeas. Apesar da tendência a um número maior de fêmeas, o desvio na razão sexual não foi significativo ($\chi^2=2,793$, g.l.=1, $p=0,095$). Entre os indivíduos do tratamento 1 foi detectado dimorfismo sexual quanto ao comprimento das asas posteriores e anteriores, com fêmeas maiores (Figura 3).

Foi observada também protandria (figura 4). Apesar de apenas dois indivíduos terem emergido nos tratamentos de temperaturas mais baixas, eles claramente possuem uma maior proporção da região ventral da asa de cor escura. Não foi observada indução de diapausa em nenhum dos tratamentos

Conclusão

A grande mortalidade dos animais nos tratamentos a baixa temperatura indicam que, além de não realizar diapausa, *C. lacinia* não resiste a essas temperaturas, e futuros estudos devem ser realizados com temperaturas mais altas. A presença de dimorfismo sexual e protandria são indícios de que as fêmeas são mais beneficiadas do que os machos por tamanhos grandes e por isso têm a tendência a apresentar maior tempo de desenvolvimento. O desvio observado na razão sexual, apesar de não significativo, merece estudos mais profundos, dada a possibilidade de haver algum mecanismo causando a morte diferencial de machos. Finalmente, futuros estudos que tenham como objetivo estudar a variação de coloração em *C. lacinia* deve atentar para sua dependência da temperatura.

1. INTRODUÇÃO

Das espécies que compartilham o mesmo nicho trófico, espera-se que, em muitos casos existam competições pelas fontes de alimento no caso dos visitantes florais, ou pelo agente polinizador, no caso das plantas. Dessa forma a associação espaço-temporal tem sido a mais utilizada para explicar a evolução dos sistemas generalizados. No entanto, contrapondo a discussão acerca da generalização-especialização dos mecanismos de polinização, alguns autores têm destacado que o fato de uma planta possuir uma gama de visitantes florais não relacionados filogeneticamente, não significa exatamente um sistema generalizado. De acordo com essa linha de pensamento, diversos visitantes podem ser incluídos em grupos funcionais, os quais permitem entender a especialização através da evolução adaptativa.

Desta forma, este trabalho teve por objetivo discutir a temática Especialização X Generalização a partir do estudo de caso com *Davilla kunthii* (Dilleniaceae), em Itacoatiara-Amazonia Central.

2. MATERIAL E MÉTODOS

O experimento foi realizado no mês de setembro de 2007. As populações estavam entre si pelo menos quatro quilômetros. Foram realizadas 72 horas de observação sendo 18 horas em cada população, os visitantes florais foram contados nos vinte primeiros minutos de cada hora e observados quanto à legitimidade da visita nos quarenta minutos restantes. Os dados foram analisados pelo coeficiente de Jaccard. A curva do coletor atingiu estabilização.

3. RESULTADOS E DISCUSSÃO

Foram registradas 40 espécies de visitantes florais, dos quais 31 foram considerados polinizadores. A maioria dos visitantes pertence à família Apidae (35 spp.), os demais visitantes foram Vespidae (3 spp.), Syrphidae (1 sp.) e Curculionidae (1 sp.). Os quatro pontos amostrais foram considerados diferentes entre si quanto à composição de espécies de visitantes florais, de modo que o sistema de polinização de *D. kunthii* pode ser considerado generalizado. No entanto pondera-se que a planta apresenta muitos caracteres que a inserem na Síndrome da Melitofilia, como cor amarela, odor adocicado, morfologia pouco restritiva (Tipo prato). Embora os visitantes pertençam a três grupos não filogeneticamente relacionados, todos, a exceção apenas dos coleópteros podem ser considerados como integrantes do mesmo grupo funcional. Considera-se que *D. kunthii* pode ser um importante modelo para discussão da temática generalização X especialização na região Amazônica, onde poucos são os dados existentes acerca dos sistemas de polinização.

Espécies	Constância	Abundância
1. <i>Aparatrigona impunctata</i> Ducke, 1916	- - Z -	1
2. <i>Apis mellifera</i> Linnaeus, 1758	Z Z Z Z	22
3. <i>Camargoa camargoi</i> Moure, 1989	Z Y Z -	64
4. <i>Cephalotrigona cf. femorata</i> Smith, 1854	Z Z Z Z	39
5. <i>Friesomelitta grupo silvestrii</i> Friese, 1903	- - - -	1
6. <i>Friesomelitta portoi</i> Friese, 1900	- Z - -	1
7. <i>Friesomelitta trichocerata</i> Moure, 1990	Z - Z Z	3
8. <i>Melipona amazonica</i> Schulz, 1905	Z Z Z Z	7
9. <i>Melipona bradleyi</i> Schwarz, 1932	- - Z -	2
10. <i>Melipona capnosa</i> Moure, 1962	- - Z -	3
11. <i>Melipona fulva</i> Lepelletier, 1836	Z Z Z Z	14
12. <i>Melipona lateralis</i> Erichson, 1848	- - - Z	3
13. <i>Nanomelipona</i> sp.	Z Z - -	6
14. <i>Partamona mourei</i> Camargo, 1980	Z Z Z -	7
15. <i>Partamona vicina</i> Camargo, 1980	- - Z Z	11
16. <i>Plebeia</i> sp.	Y Z - -	65
17. <i>Prototrigona lurida</i> Smith, 1854	- Z - -	2
18. <i>Schwarzula coccidiphila</i>	- - Z Z	1
19. <i>Tetragona bebei</i> Friese, 1938	- Z Y Z	7
20. <i>Tetragona essequiensis</i> Schwarz, 1940	- Z - -	200
21. <i>Tetragona goetzei</i> Friese, 1900	- Z Z -	4
22. <i>Tetragona handlirschi</i> Friese, 1900	- Z Z -	10
23. <i>Tetragonisca grupo angustula</i> Latreille, 1811	- Z Z -	14
24. <i>Trigona brameri</i> Cockerell, 1912	Z - Z Z	47
25. <i>Trigona grupo fuscipennis</i> Friese, 1900	- - Z Y	112
26. <i>Trigona guianae</i> Cockerell, 1910	Z Z - Z	22
27. <i>Trigona lacteipennis</i> Friese, 1900	- - Z Z	2
28. <i>Trigonisca vitrifrons</i> Albuq. & Camargo, 2007	- Z - -	3
29. <i>Tetrapedia</i> sp. 1	- - Z Z	3
30. <i>Tetrapedia</i> sp. 2	- - - -	1
31. <i>Megachile</i> sp.	- Z Z -	1
32. <i>Angochloropsis</i> sp. 1	Z Z - Z	6
33. <i>Angochloropsis</i> sp. 2	- Z - -	5
34. <i>Angochloropsis</i> sp. 3	Y Z - -	71
35. <i>Exomalopsis</i> sp.	Z - - -	3

Figura 01. Curva do Coletor

Figura 02. Diagrama Euleriano

Efecto de la posición en la distribución de recursos en frutos de *Euterpe edulis* (Arecaceae): ¿Factores selectivos o fisiológicos?

Mauricio Fernández Otárola y Patrícia Sanae Sujii
Universidade Estadual de Campinas (UNICAMP), Brasil

El palmito (*Euterpe edulis*) es una especie dispersada por aves. En sus infrutescencias, los frutos cerca del eje principal son más accesibles para muchos grupos de aves y su probabilidad de dispersión es más alta. Dado que en frutos ornitocóricos su posición en la infrutescencia puede influir en su dispersión sería esperada una mayor inversión en frutos con mayor probabilidad de dispersión. Además, procesos fisiológicos *per se* pueden influir en la cantidad de recursos que cada fruto recibe.

Este trabajo analiza el efecto de la posición en la producción y tamaño de frutos de *E. edulis* en un área de Bosque Atlántico del Parque Estadual Intervales, São Paulo, Brasil.

Materiales y métodos

Euterpe edulis es la palmera más común en el Bosque Atlántico pudiendo alcanzar hasta 15m de altura. Fue fuertemente explotada industrialmente por su palmito hasta los años 70 (Galletti et al. 1999). La dispersión de la especie es ornitocórica principalmente por tucanes, turdidos, entre otros (Galletti et al. 1999). Sus infrutescencias son paniculiformes con ramificaciones (raquillas). Cada raquilla presenta cerca de 200 flores sésiles inseridas en triadas (dos masculinas y una femenina (Reitz et al. 1983), que abren asincrónicamente (protándrica) (Laps 1996). Es posible observar una cicatriz para cada flor/fruto producido.

Fueron muestreados 10 individuos/infrutescencias. La presencia de cicatrices/frutos y el diámetro de una muestra de frutos fueron registrados en nueve raquillas por infrutescencia. Las raquillas en las infrutescencias así como los frutos en cada raquilla fueron categorizados según su posición en basal, central y distal.

La relación entre el diámetro del fruto y su distancia a la base de la raquilla fue analizada por medio de regresiones simples. Los frutos fueron categorizados según su posición dentro de la infrutescencia (Posición) y dentro de la raquilla (Categoría del fruto) en basal, medio y distal. El tamaño promedio del fruto en las diferentes categorías fue comparado con un análisis de varianza completamente anidado, donde la variable palmera fue definida como aleatoria.

Resultados y Discusión

No se encontró una relación clara entre la distancia a la base de la raquilla y el tamaño del fruto, siendo as relaciones encontradas altamente variables (fig. 1).

Al comparar la producción de frutos a lo largo de las raquillas por individuo, siete de 10 infrutescencias presentaron una mayor producción de frutos cerca de la base, con disminución en la producción cerca de la parte distal (fig. 2).

Figura 1. Relación entre el tamaño del fruto y su posición dentro de la infrutescencia para nueve individuos de *Euterpe edulis*.

Base de la infrutescencia: círculos y línea roja; mitad de la infrutescencia: cruces y línea verde; parte distal de la infrutescencia: puntos y línea azul.
NS: no significativo, *p<0.05, **p<0.05, ***p<0.001.

Figura 2. Regresión logística para la probabilidad de ausencia/presencia de frutos en las diferentes posiciones posibles a lo largo de las raquillas para infrutescencias de diez individuos de *E. edulis*. Puntos arriba de la línea representan frutos desarrollados y puntos debajo de esta son cicatrices. La línea representa la probabilidad de no producir un fruto para cada posición. ns: no significativo, *p<0.05, **p<0.05, ***p<0.001

No se encontró diferencia en el tamaño de los frutos entre las raquillas según su posición en la infrutescencia, pero fue encontrada una diferencia en el tamaño de los frutos dentro de las raquillas, siendo los frutos terminales más pequeños que los de las otras posiciones (Tukey no mostrado; cuadro 1).

Cuadro 1. Análisis de varianza anidado de los diámetros de los frutos de *E. edulis* para las nueve infrutescencias muestreadas.

Factor	gl	F	Prob.
Posición	2	1.0202	0.3834
Cat. Fruto	2	30.0482	<0.0001
Cat. Fruto/Posición	4	1.2391	0.2630

Posición: posiciones (basal, medio, distal) de las raquillas en la infrutescencia.

Categoría del Fruto: posiciones (basal, medio, distal) de los frutos en las raquillas de la infrutescencia

Conclusión

No es posible determinar la causa principal que explica las variaciones observadas, pero una explicación fisiológica y una evolutiva favorecerían de igual forma el patrón de disminución del tamaño de los frutos más distantes e inaccesibles para los dispersores.

Bibliografía

- Galletti, M., V.P. Zipparo e P.C. Morelato. 1999. Fruiting phenology and frugivory of the palm *E. edulis* in a lowland atlantic forest of Brazil. *Ecotropica* 5: 115-122
- Reitz, R., R.M. Klein, e A. Reis. 1983. Projeto madeira do Rio Grande do Sul. *Sellowia* 34-35: 1-525
- Laps, R. R. 1996. Frugivoria e dispersão de sementes de palmiteira (*Euterpe edulis*, Martius Arecaceae) na Mata Atlântica, sul do Estado de São Paulo. Dissertação de mestrado, Universidade Estadual de Campinas, Campinas, SP

Agradecimientos

A los profesores Begoña García, José María Gómez, Marco A. Pizo, Mauro Galletti, Pedro Jordano y Wesley Silva.

QUEM TEM MEDO DO VEGETAL? A VISÃO DOS ALUNOS AO FINAL DO ENSINO FUNDAMENTAL SOBRE BOTÂNICA

ENGEL, Thaíssa Brogliato Junqueira^{1,3}; BORGES, Poliana Faria¹; NOGUEIRA-FERREIRA, Fernanda Helena²

1. Graduanda em Ciências Biológicas na Universidade Federal de Uberlândia (UFU), 2. Docente no Instituto de Biologia na Universidade Federal de Uberlândia (UFU), 3. thaissa.engel@hotmail.com

LEN
Laboratório de Ensino de Ciências e Biologia

INTRODUÇÃO

O ensino de botânica é considerado um desafio para os professores, em função de seu aspecto teórico, descritivo, tecnicista e tradicional. Soma-se a isso o vocabulário extenso e técnico, e o fato de as plantas não serem consideradas ativas e carismáticas como os animais. Nesses moldes, a Botânica torna-se desinteressante aos alunos, um público atualmente condicionado ao dinamismo cotidiano e aos avanços tecnológicos.

MATERIAIS E MÉTODOS

- Foi elaborado um questionário (Fig. 1)
- O questionário foi aplicado a alunos de 9º ano de uma escola municipal de Uberlândia, MG
- As respostas foram examinadas e agrupadas para a análise quantitativa

Figura 1. Questionário aplicado aos alunos

Este trabalho objetivou diagnosticar a opinião de alunos do 9º ano do Ensino Fundamental acerca do estudo das plantas, sob uma perspectiva comparativa em relação aos demais conteúdos de Ciências.

RESULTADOS E DISCUSSÃO

QUAL É A SUA MATÉRIA PREFERIDA?

VOCÊ GOSTA DE CIÊNCIAS?

DE QUAL CONTEÚDO DE CIÊNCIAS VOCÊ GOSTA MAIS?

O QUE VOCÊ ACHA DO ESTUDO DAS PLANTAS?

CONCLUSÃO

Apesar de Ciências ser a matéria preferida pela maioria, e de os alunos perceberem a importância do estudo de Botânica, a maioria não gosta desse conteúdo. Além disso, o fato de considerarem relevante o estudo da Botânica por implicações agrícolas, farmacêuticas, alimentares e obtenção de oxigênio, demonstra que os alunos não conseguem enxergar as plantas de maneira holística e sistêmica num contexto ecológico e natural; apenas conhecem suas utilizações antrópicas.

Fica evidente a necessidade de repensar, recriar e adequar o ensino de Botânica, enfatizando seus aspectos ecológicos, ampliando a visão dos alunos, e torná-lo mais interessante aos mesmos por meio de metodologias alternativas como a utilização de jogos didáticos, aulas práticas, experimentos, visitas a praças, parques e centros de ciências.

Comportamento meiótico em *Adenocalymma peregrinum* (Miers) L. Lohmann (Bignoniaceae): Sincronopatria com *Adenocalymma campicola* (Pilg.) L. Lohmann gera híbridos naturais?

Thaissa Brogliato Junqueira Engel^{1,2}, Diana Salles Sampaio¹, Júlia Yamagishi-Costa¹
1. UFU; 2. thaissa.engel@hotmail.com

FAPEMIG

Fundação de Amparo à Pesquisa do Estado de Minas Gerais

INTRODUÇÃO

Fig. 1 - *A. peregrinum*

Adenocalymma peregrinum (Bignoniaceae) é um subarbusto típico de cerrado, invasor de pastagens no Mato Grosso do Sul, onde causa prejuízos à agropecuária. No Clube de Caça e Pesca Itororó de Uberlândia (CCPIU), Uberlândia, MG, ocorre em sincronopatria com *A. campicola*, com quem compartilha polinizadores, tornando a hibridação natural tão possível quanto a artificial, que gera frutos e sementes viáveis.

Objetivou-se conhecer o comportamento meiótico e avaliar normalidade em tétrades e corabilidade em pólen de *A. peregrinum* das populações de Campo Grande (CG), onde apenas *A. peregrinum* ocorre, e do CCPIU, onde coexiste com *A. campicola*, a fim de verificar se há anormalidades na microsporogênese da espécie e diferenças entre as populações que possam indicar existência de híbridos naturais no CCPIU.

MATERIAIS E MÉTODOS

Botões florais de *Adenocalymma peregrinum* foram coletados nas populações CG (Campo Grande, MS) e CCPIU (Uberlândia, MG)

Os botões são fixados em Carnoy por pelo menos 24h

As anteras recebem uma gota de carmim acético

As lâminas são preparadas pela técnica convencional de esmagamento

Foram consideradas normais as tétrades com os quatro micrósporos de mesmo tamanho e sem micronúcleo e os grãos de pólen corados e de tamanho regular. As análises estatísticas foram realizadas no Systat 10.2

RESULTADOS E DISCUSSÃO

Figs. A a E - Células meióticas. A e B - Metafase I com micronúcleo (seta) e cromossomo fora da placa metafásica (cabeça de seta). C e D - células em anáfase I com pontes e cromossomos retardatários (setas) e fora dos conjuntos cromossômicos (cabeça de seta). E - Diacinese com polivalentes em anéis (setas; cabeça de seta indica possível bivalente). Barra=10µm. F a K - Tétrade normal (A) e anomalias (B a F) encontradas na fase de tétrades: micronúcleos (G) micrósporos de tamanhos diferentes (H) e conjuntos com número de micrósporos diferente de quatro, variando de cinco até doze (J e K). Barra=10µm. L a O - Grãos de pólen de tamanho anormal (L, aumentado; M, reduzido) em relação ao tamanho comumente encontrado (N). Os grãos de pólen podem conter citoplasma ou não, apresentando-se descorados quando desprovidos de citoplasma (M, O). Barra= 10µm.

Tabela 1- legenda legenda legenda legenda legenda legenda legenda

População	Erros na meiose	Tétrades anormais	Pólen anormais
CG	micronúcleos, cromossomos retardatários e/ou fora da placa metafásica e pontes anafásicas na microsporogênese.	0,60% ± 0,732 em 1.840	2,03% ± 1,048 em 1.925
CCPIU	Além dos erros acima, falhas na formação dos bivalentes e anéis de translocação	4,11% ± 3,759 em 2.168	2,65% ± 1,956 em 2.000

O número de tétrades anormais foi maior (U=3.000; p=0,01) em CCPIU que em CG e ambas as populações apresentaram tétrades com micronúcleos. CG mostrou políades com 5 micrósporos e CCPIU, políades com até 12 e, uma lâmina, desconsiderada na análise estatística, com 80% de tétrades anormais. Ambas as populações apresentaram grãos de pólen menores e/ou sem coloração, mas não houve diferença (U= 14.000; p=0,521).

A maior frequência de erros e um desvio padrão maior refletem maior instabilidade no processo meiótico em CCPIU indicando que pode haver híbridos naturais estabelecidos na comunidade.